

QuickTime™ et un  
décompresseur TIFF (LZW)  
sont requis pour visionner cette image.

## Espace Médico-Chirurgical de la Sauvegarde Chirurgie digestive et endocrinienne

### **SUIVI APRES CHOLECYSTECTOMIE**

Vous venez de bénéficier d'une cholécystectomie. Les conseils qui suivent vont vous aider à vous rétablir dans les meilleures conditions

#### **CHIRURGIENS**

Dr Vincent FRERING  
Dr Eric FONTAUMARD

#### **ENDOCRINOLOGUE**

Dr Sylvie RODE

#### **NUTRITIONNISTE**

Dr Yann MATUSSIÈRE

#### **PSYCHIATRE**

Dr EBERHARDT Céline

#### **PLASTICIEN**

Dr WEILL Eric

#### **INFIRMIÈRE**

Mme DOLIGÈZ-  
JOURNAUD  
Sophie

#### **DIÉTÉTICIENNE**

Violaine DOUELLOU

#### **SECRETARIAT**

##### **Chirurgie**

Séverine AMOYAL  
Mélanie FARJAT  
Aurélie LUDI  
Elodie VENET  
Malika REBIA

#### **Endocrinologie**

Claire DUMONT

#### **Nutrition**

Virginia DUPRAT

#### **Gastro-entérologues**

Dr Sylvain BEORCHIA  
Dr Thierry BIZOLLON  
Dr Muriel LOT  
Dr Alfred ZARKA

#### **Anesthésistes**

Dr Jean-Pierre BAECHLE  
Dr Pierre LEROY  
Dr Pierre-Mickaël BOUCHE  
Dr Rudy STAGNI  
Dr Patrick CONNIN  
Dr Emmanuel  
COMBOURIEU

Tel : 04 37 49 70 10

Fax : 04 37 49 70 13

**Urgences 04 72 17 26 00**

#### **L'alimentation :**

Il n'y a pas de régime particulier après ce type d'intervention. Veuillez éviter simplement les aliments gras pendant quelques jours.

#### **Les soins post-opératoires :**

Les pansements : il n'y a ni suture, ni agrafes. Vous pouvez prendre une douche sur les pansements qui sont étanches. Vous enlevez ces pansements au bout de 5 jours. Puis les fils qui ferment la peau tomberont progressivement. Vous avez une ordonnance avec de la bétadine et des compresses pour désinfecter une cicatrice qui mettrait un peu plus de temps.

Ce qui doit vous inquiéter ; une température supérieure à 38°5, une cicatrice rouge, douloureuse.

Vous avez une ordonnance avec un traitement antalgique. Prenez les avant d'avoir trop mal il n'en seront que plus efficaces. Un traitement protecteur de l'estomac est prescrit. Veillez à le suivre scrupuleusement.

Les anti-coagulants sont donnés dans des cas particuliers, intervention longue, antécédents de phlébites... Si vous en avez un de prescrit, pensez à faire la surveillance par des prises de sang comme indiqué sur l'ordonnance.

#### **Reprise des activités**

Une semaine de repos au domicile est, en général, nécessaire. Ne prévoyez pas d'activités extraordinaires. Suivant la profession le travail peut être repris entre 15 jours et un mois après l'intervention. Pour le sport la reprise peut se faire progressivement un mois après l'intervention.. En règle générale,

#### **Les incidents**

Une diarrhée en règle transitoire peut être observée. Elle est due à une irritation par les sels biliaires et s'estompe en général. Si elle persiste, n'hésitez pas à en parler.

#### **Ce qui doit vous inquiéter :**

##### **Les vomissements**

##### **Douleur au ventre**

##### **Selles décolorées et teint jaune**

**Veillez alors nous contacter.**

**Informations sur [www.chirurgien-digestif.com](http://www.chirurgien-digestif.com)**